

หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงกับแผล
และล้างออกให้หมด
(ถ้าจำเป็นเวลาเบา 15 นาที) การล้างแผล
จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**



2. ทายาบาดต้น
และรับยาพาราเซตามอล
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษาลำ
และฉีดวัคซีนป้องกันโรค



3. ศึกษามัฟเพื่อศอกการ **10 วัน**
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย
แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4. ฉีดวัคซีนค่อให้ครบตามนัด
และควรเข้ารับวัคซีน
ให้ตรงตามกัแพทย์นัด



ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?

หลักการ **5 ย. ไต่กั**
“อย่าเหยย อย่าเหยยบ อย่าแยก
อย่าหยีบ อย่าย่ง”



1. **อย่าเหยย**
ให้สุนัขโปโ



2. **อย่าเหยยบ** สุนัข
หรือทำให้ตกใจ



3. **อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกับ
ตัวมือเปล่า



4. **อย่าหยีบ** ซากอาหาร
หรือของกัสุนัขทวง



5. **อย่าย่ง** กับสุนัขจรจัด
หรือสุนัขกัไม่ทราบประวัติวัคซีน



f กรมควบคุมโรค



@line 1422

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

พื่อษา ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรค พิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิต ทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีน

Rabies virus



ป้องกันไม่ให้ยารักษา
โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็น

โรคพิษสุนัขบ้า

มีอาการอย่างไร?

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้

3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการอ่อนแอและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว
กินน้ำลดลง

2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น

ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างไม่เลือก

วิ่งไล่กัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต

ทางตก ลื่นห้อยลิ้นแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัว
ไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติด
จากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดต่อได้ทางไหนบ้าง?

สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน

ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่
ร่างกายผ่านทางบาดแผล แผลเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถติดต่อได้



2. ถูกเลี้ยงที่บาดแผล

รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน
รวมทั้งริมฝีปากหรือขนัยน้ำตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ

3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

• อาการเริ่มแรก:

ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร

อ่อนเพลีย และคลื่นรบกวนบริเวณแผลที่ถูกกัด



• อาการทางประสาท:

กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย

กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น

กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว

• อาการระยะสุดท้าย:

กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง

หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หดสติและ

เสียชีวิตในที่สุด



RIP